

Supplemental Informations:

Cardioprotective effect of sonic hedgehog ligand in pig models of ischemia reperfusion

Bijan Ghaleh^{*1}, Jérôme Thireau^{*2}, Olivier Cazorla², Raffaella Soleti³, Valérie Scheuermann², Alain Bizé¹, Lucien Sambin¹, François Roubille², Ramaroson Andriantsitohaina³, Maria Carmen Martinez^{£ 3}, Alain Lacampagne^{£ 2}

*Same contribution

¹ U955-IMRB, Equipe 03, Inserm, UPEC, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort, France

² Université de Montpellier, Inserm, CNRS, CHRU Montpellier, Montpellier, France

³ SOPAM, U1063, INSERM, UNIV Angers, SFR ICAT, Angers, France

£ correspondance to :

Dr Alain Lacampagne

Phymedexp, UMR CNRS 9214 – Inserm U1046

Physiologie et Médecine Expérimentale du Cœur et des Muscles

CHU Arnaud de Villeneuve

34295 Montpellier Cedex 05

Phone : + 33 467 415 228

Fax : +33 467 415 242

email: alain.lacampagne@inserm.fr

Dr Maria Carmen Martinez

Inserm U1063

IBS Institut de Biologie en Santé

4 rue Larrey

49933 ANGERS Cedex 9

Phone : + 33 244 688 584

email: carmen.martinez@univ-angers.fr




Figure S1: Reperfusion arrhythmias and N-SHH treatment after 40 minutes of coronary artery occlusion. (A) sinus pause, (B) ventricular extra-systoles, (C) ventricular tachycardia and (D) ventricular fibrillation measured before ischemia (base) during 3 hours starting 1 hour after reperfusion (1-4h) and at 24 hours after reperfusion (24h) (n=7 Controls, n=7 SHH).